


Fiche d'attitude : Maux de tête



ATTITUDE

En l'absence des signes de gravité ci-dessus :

- Installer le patient dans un endroit calme, le laisser se reposer
- Lui proposer 1g de paracétamol (après avoir lu la fiche sur le paracétamol)

Proposer une consultation médicale non urgente en cas de :

- Maux de tête devenant chroniques ou persistants depuis plus de 3 jours
- Maux de tête d'apparition récente ou de caractère inhabituels
- Maux de tête matinaux avec ronflements nocturnes

NOTES

¹En cas d'exposition à des fumées, penser à une intoxication au monoxyde de carbone (maux de tête, agitation, altération de l'état de conscience, nausées, douleurs abdominales, ...)

²La méningite peut se présenter avec les signes et symptômes suivants : état fébrile (>38°), maux de tête, nuque raide, photophobie (patient ne supporte pas la lumière), pétéchies (taches rouges-violettes sur la peau, ne s'effacent pas si l'on applique une pression dessus)

³en cas de mydriase unilatérale lentement réactive avec oeil rouge, douloureux, induré, penser à un glaucome aigu

NB1 : Une anomalie au 1^{er} bilan et l'application des MISV entraîne immédiatement une alarme au 144

NB2 : lors d'un service avec médecin présent sur place, vous devez référer au médecin avant d'appeler le 144 ou d'administrer un médicament